

BORO 10%

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM APÓS O USO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Boro 10% é um fertilizante foliar complexo preparado para suprir as deficiências de Boro, sua rápida absorção permite uma gama de aplicações as mais diversas culturas. Boro 10% é compatível com a maioria dos produtos na calda e apresenta maior aproveitamento quando aplicado em horários mais frescos do dia, sendo possível sua aplicação aérea, terrestre ou costal. Maior relação soluto: solvente - 40 g/L.

AVISO: Este produto deve ser armazenado em local fresco, ventilado e ao abrigo da chuva e do sol. Esta embalagem não deve ser reutilizada. Manter longe de alimentos e do alcance de crianças e animais. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Produto de uso agrícola. Limpe o pulverizador regularmente. Use os equipamentos de segurança recomendados para as aplicações.

Frases de precaução:

P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301 + P330 + P331 - SE ENGOLIDO: Lavar a boca. Não induzir vômito.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Conteúdo Líquido: 20L



Fabricado e envasado por:
CROPTEC FERTILIZANTES LTDA.
CNPJ 20.794.495/0001-85 | I.E. 90672841-91
Rua Julieta Lordani da Silva, 100
Bandeirantes | PR | CEP 86360-000
(43) 3542-0692 | Reg. Estab. MAPA EP-PR 001937-2
Reg. Produto: PR 001937-2.000004

Indústria Brasileira 

GARANTIAS - SOLÚVEIS EM ÁGUA

Boro (B) 10,0% (11,0 g/L)

Densidade 1,36g/cm³ | Aplicação: Via Foliar

Natureza física: Fluido - Solução Verdadeira

Contém: Borato de Monoetanolamina e agente corante.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Culturas	Dosagem	Época de aplicação
Algodão	1 a 1,5 / 100L de água ou Ha	Pré e pós florescimento.
Batata	200mL / 100L de água ou Ha	Aos 20, 30 e 45 D.A.E.
Café	250mL / 100L de água	Pré e pós florescimento.
Citrus e outras frutíferas	1 a 1,5L / 2.000L de água	Florescimento e período das chuvas.
Uva	0,6 a 0,8L / 2.000L de água	Início da brotação até a florada.
Milho, Sorgo, Arroz e Trigo	300 a 500 mL / 100L de água ou Ha	25 a 40 dias após emergência.
Soja e Feijão		25 dias após emergência e pré-florescimento
Tomate, Pimentão e Cebola	100mL / 100L de água	Aplicações quinzenais, iniciando aos 25 D.A.E. (dias após a emergência).

Lote / volume:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE
EMBALAGEM



DESCARTE A EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL.